

Trauma y salud mental en pacientes con epilepsia y crisis funcionales disociativas.

Lanzillotti, Alejandra Inés.

Cita:

Lanzillotti, Alejandra Inés (2025). *Trauma y salud mental en pacientes con epilepsia y crisis funcionales disociativas*. XVII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXXII Jornadas de Investigación XXI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. VII Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. VII Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-004/583>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eNDN/D3n>

TRAUMA Y SALUD MENTAL EN PACIENTES CON EPILEPSIA Y CRISIS FUNCIONALES DISOCIATIVAS

Lanzillotti, Alejandra Inés

CONICET - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

La Epilepsia (EP) es un trastorno neurológico crónico caracterizado por una predisposición sostenida del cerebro para generar crisis epilépticas. Las Crisis Funcionales Disociativas (CFD) son eventos repentinos con manifestaciones motoras, sensoriales, mentales o autonómicas, sin una base neurológica identificable. Ciento tres pacientes atendidos en hospitales públicos completaron entrevistas y cuestionarios clínicos, tras firmar un consentimiento informado. El 65% presentaba diagnóstico de EP (65.7% mujeres), el 19.4% de CFD (65% mujeres) y el 15.5% ambos diagnósticos (75% mujeres). Los antecedentes de vivencias traumáticas se observaron en el 46.3% de los pacientes con EP, en el 75% de los pacientes con CFD y en el 56.3% de los pacientes con diagnóstico mixto, sin encontrarse una asociación significativa entre el diagnóstico y estos antecedentes ($p=.075$). Los pacientes que presentaban antecedentes de trauma reportaron una peor calidad de vida ($p=.044$), mayores niveles de sintomatología depresiva ($p=.044$) y de ansiedad ($p=.001$) en comparación con aquellos que no los presentaban. Además, se observó una asociación significativa entre los antecedentes de trauma y de intentos de suicidio ($p=.040$). Estos resultados sugieren que el trauma constituye un factor de riesgo relevante que debe ser tenido en cuenta a fin de ofrecer estrategias terapéuticas adecuadas para esta población.

Palabras clave

Epilepsia - Crisis funcionales - Trauma psicológico - Salud mental

ABSTRACT

TRAUMA AND MENTAL HEALTH IN PATIENTS WITH EPILEPSY AND FUNCTIONAL DISSOCIATIVE SEIZURES

Epilepsy (EP) is a chronic neurological disorder characterized by a sustained predisposition of the brain to generate epileptic seizures. Functional Dissociative Seizures (FDS) are sudden episodes with motor, sensory, mental, or autonomic manifestations, without an identifiable neurological basis. A total of 103 patients receiving care at public hospitals participated in the study by completing interviews and clinical questionnaires after providing informed consent. Among them, 65% were diagnosed with EP (65.7% women), 19.4% with FDS (65% women), and 15.5% with both diagnoses (75% women). A history of traumatic experiences was reported by 46.3% of patients with EP, 75% with FDS, and 56.3% with both diagnoses. No statistically significant

association was found between diagnosis and trauma history ($p=.075$). However, patients with a trauma history reported poorer quality of life ($p=.044$), higher levels of depressive symptoms ($p=.044$), and anxiety ($p=.001$) compared to those without such history. Additionally, a significant association was found between trauma history and suicide attempts ($p=.040$). These findings suggest that trauma represents a relevant risk factor that should be considered in order to provide appropriate therapeutic strategies for this population.

Keywords

Epilepsy - Functional dissociative seizures - Psychological trauma - Mental health

BIBLIOGRAFÍA

- Boesten, N., Myers, L., & Wijnen, B. (2019). Quality of life and psychological dysfunction in traumatized and nontraumatized patients with psychogenic nonepileptic seizures (PNES). *Epilepsy & Behavior*, 92, 341-344. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2019.01.024>
- Fizman, A., Alves-Leon, S. V., Nunes, R. G., D'Andrea, I., & Figueira, I. (2004). Traumatic events and posttraumatic stress disorder in patients with psychogenic nonepileptic seizures: a critical review. *Epilepsy & Behavior*, 5(6), 818-825. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2004.09.002>
- Jones, L. L., & Rickards, H. (2021). History of abuse and psychogenic nonepileptic seizures: A systematic review. *Seizure*, 92, 200-204. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2021.09.009>
- Labudda, K., Frauenheim, M., Illies, D., Miller, I., Schrecke, M., Vietmeier, N., Brandt, C., & Bien, C. G. (2018). Psychiatric disorders and trauma history in patients with pure PNES and patients with PNES and coexisting epilepsy. *Epilepsy & Behavior*, 88, 41-48. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2018.08.027>
- Myers, L., Trobliger, R., Bortnik, K., Zeng, R., Saal, E., & Lancman, M. (2019). Psychological trauma, somatization, dissociation, and psychiatric comorbidities in patients with psychogenic nonepileptic seizures compared with those in patients with intractable partial epilepsy. *Epilepsy & Behavior*, 92, 108-113. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2018.12.027>
- Nimmo-Smith, V., Brugha, T. S., Kerr, M. P., McManus, S., & Rai, D. (2016). Discrimination, domestic violence, abuse, and other adverse life events in people with epilepsy: Population-based study to assess the burden of these events and their contribution to psychopathology. *Epilepsia*, 57(11), 1870-1878. <https://doi.org/10.1111/epi.13561>



Soncin, L. D., McGonigal, A., Kotwas, I., Belquaid, S., Giusiano, B., Faure, S., & Bartolomei, F. (2021). Post-traumatic stress disorder (PTSD) in patients with epilepsy. *Epilepsy & Behavior*, 121(Pt A). 108083. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.108083>