

XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2020.

Tendencia suicida en Argentina y relación con la pandemia COVID-19.

Grasso, Jimena, Melone, Micaela, Natali, Vanesa Giselle y Helmich, Natalia.

Cita:

Grasso, Jimena, Melone, Micaela, Natali, Vanesa Giselle y Helmich, Natalia (2020). *Tendencia suicida en Argentina y relación con la pandemia COVID-19. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-007/294>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/etdS/68E>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

TENDENCIA SUICIDA EN ARGENTINA Y RELACIÓN CON LA PANDEMIA COVID-19

Grasso, Jimena; Melone, Micaela; Natali, Vanesa Giselle; Helmich, Natalia
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

El presente estudio intenta conocer y describir la tendencia suicida, el afrontamiento a la conducta suicida y parasuicida y, el impacto de la duración de la cuarentena del COVID-19 a nivel nacional. Argentina es el tercer país con la tasa más alta de suicidios en Sudamérica (OMS, 2019). Por tal motivo, hemos realizado un estudio descriptivo probabilístico y transversal para relevar la ideación y el intento suicida a lo largo de la vida en la población argentina. La muestra se compone de 1401 personas de 18 a 65 años. Para conocer la suicidabilidad de la población, se les preguntó si alguna vez habían pensado o intentado quitarse la vida. Se encontró que un 51,2% de la muestra total pensó en quitarse la vida y que un 37,2% lo había intentado. Frente a la pandemia COVID-19, nos hemos preguntado si la duración de la cuarentena impacta en el riesgo de suicidio. Para ello hemos realizado dos encuestas online. En la muestra 1 (7-11 días) participaron 2631 sujetos y 2068 sujetos (50-55 días) en la muestra 2. Se observó un aumento significativo de la tendencia suicida asociado a la cantidad de días de cuarentena obligatoria.

Palabras clave

Tendencias suicidas - Cuarentena - Malestar psicológico - Riesgo

ABSTRACT

SUICIDAL TENDENCY IN ARGENTINA AND RELATION TO THE PANDEMIC COVID-19

The present study seeks to know and describe the suicidal tendency, the coping with suicidal and parasuicidal behavior and the impact of the duration of the COVID-19 quarantine nationwide. Argentina is the third country with the highest suicide rate in South America (WHO, 2019). For this reason, we have carried out a probabilistic and cross-sectional descriptive study to reveal suicidal ideation and attempt throughout life in the Argentine population. The sample is made up of 1401 people from 18 to 65 years old. In order to know the risk of suicide of the population, they were asked if they had ever thought or tried to kill themselves. It was found that 51.2% of the total sample thought about killing themselves and that 37.2% had tried to do so. In the face of the COVID-19 pandemic, we have asked ourselves if the duration of the quarantine affects the risk of suicide. For this we have carried out two online surveys. In sample 1 (7-11 days), 2631 subjects and 2068 subjects (50-55 days) participated in sample

2. A significant increase in the suicidal tendency associated with the number of days of compulsory quarantine was observed.

Keywords

Suicidal tendencies - Quarantine - Psychological suffering - Risk

BIBLIOGRAFÍA

- Etchevers, M. J., Garay, C. J., Castro-Solano, A., & Fernández-Liporace, M. (2019). Estado de salud mental de la población y variables asociadas 2019. Buenos Aires, Argentina: Observatorio de Psicología Social Aplicada, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de: <http://www.psi.uba.ar/opsa/#informes>
- Etchevers, M. J., Garay, C. J., Putrino, N., Grasso, J., Natali, V. (2020). Salud mental en cuarentena: relevamiento del impacto psicológico de la cuarentena en población general. Buenos Aires, Argentina: Observatorio de Psicología Social Aplicada, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de: <http://www.psi.uba.ar/opsa/#informes>
- Etchevers, M. J., Garay, C. J., Putrino, N., Grasso, J., Natali, V., y Helmich, N. (2020). Salud Mental en Cuarentena. Relevamiento del impacto psicológico a los 7-11 y 50-55 días de cuarentena en población argentina. Buenos Aires, Argentina: Observatorio de Psicología Social Aplicada, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de: <http://www.psi.uba.ar/opsa/#informes>
- OMS (2019). Suicidio. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide>