

Déficit Atencional y queja cognitiva en pacientes con trastorno depresivo.

Medina, Lucía Micaela y Fiorentini, Leticia.

Cita:

Medina, Lucía Micaela y Fiorentini, Leticia (2020). *Déficit Atencional y queja cognitiva en pacientes con trastorno depresivo. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-007/380>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/etdS/zxH>

DÉFICIT ATENCIONAL Y QUEJA COGNITIVA EN PACIENTES CON TRASTORNO DEPRESIVO

Medina, Lucía Micaela; Fiorentini, Leticia

CONICET - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

El objetivo del presente estudio consistió en estudiar el perfil atencional en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor (TDM) e indagar en qué medida la queja cognitiva en personas con TDM se asoció con la presencia de alteraciones atencionales, a partir de la valoración del ítem del Inventory de depresión de Beck II (BDI-II), que alude a dificultades en la concentración. Se realizó un estudio comparativo de muestras independientes, con un grupo de 23 pacientes diagnosticados con depresión y un grupo control de 16 sujetos sanos. A ambos grupos les fue administrada una batería neuropsicológica completa y el cuestionario BDI-II, entre otros instrumentos de evaluación de síntomas psiquiátricos. Se compararon ambos grupos mediante pruebas de T para contrastar el rendimiento en las tareas neuropsicológicas. Se utilizó la prueba de Chi- Cuadrado para estudiar la asociación entre la presencia de queja subjetiva de dificultades de concentración y la presencia de dificultades atencionales. Los datos obtenidos soportan la hipótesis de que los pacientes con depresión presentan merma en tareas atencionales. Respecto a la asociación entre queja y alteración cognitiva los resultaron no alcanzaron significación estadística, pero sugieren una tendencia a favor de que cuando la queja cognitiva del paciente es severa, hay rendimientos deficitarios en pruebas atencionales.

Palabras clave

Atención - Trastorno depresivo mayor - Queja cognitiva

ABSTRACT

ATTENTIONAL IMPAIRMENT AND COGNITIVE COMPLAINT IN PATIENTS WITH DEPRESSIVE DISORDER

The objective of the present work was to study the attention profile in patients with Major Depressive Disorder (MDD) and to investigate to what extent the cognitive complaint in people with MDD was associated with the presence of attention disorders, based on the assessment of the Beck depression Inventory II (BDI-II) item, which refers to difficulties in concentration. A comparative study of independent samples was carried out, with a group of 23 patients diagnosed with depression and a control group of 16 healthy subjects. Both groups were administered a complete neuropsychological battery and the BDI-II questionnaire, among other instruments for evaluating psychiatric symptoms. Both groups were compared using T tests to contrast performance on neuropsychological tasks. The Chi-square

test was used to study the association between the presence of subjective complaint of concentration difficulties and the presence of attentional difficulties. The data obtained supports the hypothesis that patients with depression have decreased attention tasks. Regarding the association between complaint and cognitive impairment, the results did not reach statistical significance, but suggest a trend in favor of when the patient's cognitive complaint is severe, there are deficient performances in attention tests

Keywords

Attention - Major depressive disorder - Cognitive complaint

BIBLIOGRAFÍA

- Conradi, H.J., Ormel, J. & de Jonge P. (2011) Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study. *Psychol Med.* 41(6):1165-74
- Gonda X., Pompili M., Serafini G., Carvalho A.F., Rihmer Z. & Doms P. (2015) The role of cognitive dysfunction in the symptoms and remission from depression. *Anna Gener Psychiatry.* 14:27. doi: 10.1186/s12991-015-0068-9 11
- Hammar, A. & Ardal, G. (2009) Cognitive functioning in major depression - A summary. *Frontiers in human neuroscience.* 3(26) 1-7. doi: 10.3389/neuro.09.026.2009
- Petersen, J. Z., Porter, R. J., & Miskowiak, K. W. (2018). Clinical characteristics associated with the discrepancy between subjective and objective cognitive impairment in depression. *Journal of Affective Disorders.* doi:10.1016/j.jad.2018.12.105
- Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P., Van Breukelen, G. J., & Jolles, J. (2008). A large-scale cross-sectional and longitudinal study into the ecological validity of neuropsychological test measures in neurologically intact people. *Arch Clin Neuropsychol,* 23(7-8), 787-800. doi:10.1016/j.acn.2008.09.002
- Zuckerman H., Pan Z., Park C., Brietzke E., Musial N., Shariq A., Iacobucci M., Yim S., Lui L., Rong C., McIntyre R. (2018) Recognition and Treatment of Cognitive Dysfunction in Major Depressive Disorder. *Frontiers in Psychiatry*, 655 (9): 1-11. doi: 103389/fpsyg.2018.00655