

XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2020.

# Capacidad de resiliencia en pacientes oncológicos al principio y al final de la enfermedad.

Hauché, Rocío y Pedrón, Valeria Teresa.

Cita:

Hauché, Rocío y Pedrón, Valeria Teresa (2020). *Capacidad de resiliencia en pacientes oncológicos al principio y al final de la enfermedad. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-007/68>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

# CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS AL PRINCIPIO Y AL FINAL DE LA ENFERMEDAD

Hauché, Rocío; Pedrón, Valeria Teresa

CONICET - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología - Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Psicología y Relaciones Humanas. Buenos Aires, Argentina.

## RESUMEN

Se buscó comparar la capacidad de resiliencia entre los sujetos que se encuentren en fase diagnóstica y en fase de supervivencia, de la evolución de la enfermedad oncológica. La muestra quedó conformada por 60 participantes, adultos de ambos sexos. Un grupo consistió en 30 sujetos en fase de diagnóstico, que asisten a los Servicios Oncológicos ubicados en C.A.B.A, y el segundo grupo fue conformado por 30 sujetos en fase de supervivencia. Se administró un Cuestionario sociodemográficas ad-hoc y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993), en su versión argentina de Rodríguez, Pereyra, Gil, Jofre, De Bortoli y Labiano (2009). Los resultados arrojaron una diferencia estadísticamente significativa entre la capacidad de resiliencia y la fase de la enfermedad oncológica en la que se encuentre el paciente, lo que indica que la capacidad de resiliencia es mayor en pacientes que han concluido el tratamiento oncológico, fase de supervivencia. Considerando que los pacientes oncológicos que se encuentran en fase de diagnóstico presentan una menor capacidad de resiliencia, se elucida la importancia de realizar investigaciones en Argentina, centradas en la influencia de factores psicológicos relevantes, como es la resiliencia, en el proceso oncológico, para la optimización del sistema de atención sanitaria.

## Palabras clave

Resiliencia - Cancer - Fases de la enfermedad

## ABSTRACT

RESILIENCE CAPACITY IN ONCOLOGICAL PATIENTS AT THE BEGINNING AND AT THE END OF THE DISEASE

We sought to compare the resilience capacity between the subjects that are in the diagnostic phase and in the survival phase, of the evolution of the oncological disease. The sample was made up of 60 participants, adults of both sexes. One group consisted of 30 subjects in the diagnostic phase, who attend the Oncology Services located in C.A.B.A, and the second group consisted of 30 subjects in the survival phase. An ad-hoc sociodemographic questionnaire and the Wagnild and Young Resilience Scale (1993) were administered, in its Argentine version by Rodríguez, Pereyra, Gil, Jofre, De Bortoli and Labiano (2009). The results showed a statistically significant difference between

the resilience capacity and the phase of the oncological disease in which the patient is, which indicates that the resilience capacity is greater in patients who have completed the oncological treatment, survival phase. Considering that cancer patients who are in the diagnostic phase have a lower capacity for resilience, the importance of conducting research in Argentina, focused on the influence of relevant psychological factors, such as resilience, on the oncological process, is elucidated for the optimization of the health care system.

## Keywords

Resilience - Cancer - Phases of the disease

## BIBLIOGRAFÍA

- Rodríguez, M., Pereyra, G., Gil, E., Jofré, M., De Bortoli, M., & Labiano L. M. (2009). Propiedades psicométricas de la escala de resiliencia versión argentina. *Evaluar*, 9(1), 72-82.
- Wagnild, M., & Young, M. (1993). Desarrollo y evaluación psicométrica de la Escala de resiliencia. *Diario de medición de enfermería*, 1(2), 165-178.