

IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología
XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología
del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 2017.

Pensamiento catastrófico y rasgos de patrón de conducta tipo a en pacientes varones con el Síndrome Coronario Agudo.

Pereyra Girardi, Carolina, Ofman, Silvia
Deborah y Stefani, Dorina.

Cita:

Pereyra Girardi, Carolina, Ofman, Silvia Deborah y Stefani, Dorina (2017). *Pensamiento catastrófico y rasgos de patrón de conducta tipo a en pacientes varones con el Síndrome Coronario Agudo. IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-067/392>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eRer/GEQ>

PENSAMIENTO CATASTRÓFICO Y RASGOS DE PATRÓN DE CONDUCTA TIPO A EN PACIENTES VARONES CON EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Pereyra Girardi, Carolina; Ofman, Silvia Deborah; Stefani, Dorina
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina

RESUMEN

Introducción: En Argentina la enfermedad coronaria (EC) es la primera causa de muerte. Existe múltiple evidencia empírica que señala la importancia de los factores psicosociales en el desarrollo y curso de la enfermedad. Objetivo: Identificar los niveles de pensamiento catastrófico (PC) y la presencia de rasgos de patrón de conducta tipo A (PCTA) en un grupo de pacientes varones con Síndrome Coronario Agudo (SCA). Método: Estudio “ex post facto”, de corte transversal, con grupo cuasi-control conformado por sujetos varones sin SCA. La muestra constó de 213 sujetos varones de 45 a 75 años de edad, 106 con SCA (Grupo I) y 107 sin SCA (Grupo II - cuasi control). Se administraron: Cuestionario de datos sociodemográficos elaborado ad hoc”, Cuestionario de Cogniciones Catastróficas y el de Rasgos de PCTA. Para el análisis crítico comparativo entre los grupos se aplicó la prueba χ^2 (Ji cuadrado) de independencia estadística y la prueba “t” de Student para muestras independientes. Resultados: Se hallaron diferencias estadísticamente significativas en favor del Grupo I, quienes se caracterizan por mayores niveles de PC y mayor presencia de rasgos de PCTA. Discusión: Los datos aportan evidencia empírica para la construcción del perfil psicosocial masculino de vulnerabilidad coronaria a nivel local.

Palabras clave

Síndrome Coronario Agudo, Pensamiento Catastrófico, Patrón de Conducta Tipo A, Varones

ABSTRACT

CATASTROPHIC COGNITION AND TYPE A BEHAVIOR PATTERNS IN MALE PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME

Introduction: Coronary heart disease is the leading cause of death in Argentina. There is multiple empirical evidence that points at the importance of psychosocial factors in the development and course of the disease. Aim: To identify levels of catastrophic cognition (CC) and characteristics of Type A Behavior Pattern (TABP) in a group of male patients with Acute Coronary Syndrome (ACS). Method: An Ex post facto, cross-sectional study was carried out with a quasi-control group composed of male subjects without ACS. The sample consisted of 213 male subjects 45-75 years of age, 106 with ACS (Group I) and 107 without ACS (quasi control group). The study used a questionnaire made “ad.hoc” including sociodemographic data, TABP Trait Questionnaire and the Catastrophic Cognition Questionnaire. For the comparative critical analysis between groups, we used the χ^2 (chi-square) test of statistical independence and the “t” Student test for independent samples. Results: Statistically sig-

nificant differences were found in Group I, characterized by higher CC levels and more features of TABP. Discussion: The data provide empirical evidence for the construction of the male psychosocial vulnerability profile at the local level.

Key words

Acute Coronary Syndrome, Catastrophic Cognition, Type A Behavior Pattern, Men

BIBLIOGRAFÍA

- Nigar G. Khawaja, Tian P. S. Oei , Baglioni Jr A. J, (1994).Modification of the catastrophic cognitions questionnaire (CCQ-M) for normals and patients: Exploratory and Lisrel analyses. Journal of Psychopathology and behavioral assessment, 16 (4): 325-342
- Pereyra Girardi, C. I., Ofman, S. D., Córreces, P., Benassi, M. D., Stefani, D.(2016). Pensamiento catastrófico en pacientes varones con Síndrome Coronario Agudo”. Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina; 62(1):6-14.
- Rosenman, R.H. & Friedman, M. (1961). Association of specific behavior pattern in women with blood and cardiovascular findings. Circulation, 24: 1173-1184.