

IV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología  
XIX Jornadas de Investigación VIII Encuentro de Investigadores en Psicología  
del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos  
Aires, 2012.

# **Consumo de alcohol durante la gestación: información y actitudes en mujeres de la Ciudad de Santa Fe.**

López, Mariana Beatriz.

Cita:

López, Mariana Beatriz (2012). *Consumo de alcohol durante la gestación: información y actitudes en mujeres de la Ciudad de Santa Fe. IV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XIX Jornadas de Investigación VIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-072/310>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/emcu/hzo>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

# CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE LA GESTACIÓN: INFORMACIÓN Y ACTITUDES EN MUJERES DE LA CIUDAD DE SANTA FE.

López, Mariana Beatriz

Centro Interdisciplinario de Investigación en Psicología Matemática y Experimental (CIIPME) –  
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

---

## Resumen

El consumo de alcohol durante la gestación puede dar lugar a distintos problemas de diferentes niveles de severidad, englobados en el término Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal. El Síndrome Alcohólico Fetal, caracterizado por problemas neurológicos, retraso en el desarrollo y dismorfias cráneo-faciales, es su consecuencia más severa. Hasta el momento, no ha podido determinarse una dosis de alcohol segura durante la gestación.

La investigación sobre actitudes hacia el consumo de alcohol durante la gestación señala que la mayoría de las mujeres tiene conocimiento de que el alcohol puede alterar el desarrollo del feto, pero la abstinencia no es la conducta más común. Buscando alcanzar una mejor comprensión de las relaciones entre información, actitudes y consumo durante la gestación, realizamos un estudio exploratorio. Se analizaron las respuestas a preguntas abiertas y pre-categorizadas sobre información y actitudes hacia el consumo, realizadas en el marco de entrevistas semiestructuradas a mujeres púerperas de la ciudad de Santa Fe (n=640). El 70,4% de ellas manifestó haber recibido alguna información sobre un potencial efecto adverso del consumo de alcohol durante la gestación. La diversidad y la falta de precisión de las recomendaciones son factores importantes que podrían vincularse a las decisiones respecto del consumo.

## Palabras Clave

Alcohol, Gestación, Actitudes, Información

## Abstract

ALCOHOL CONSUMPTION DURING PREGNANCY: INFORMATION AND ATTITUDES AMONG WOMEN FROM SANTA FE CITY.

Alcohol consumption during pregnancy can lead to different problems at different levels of severity, encompassed by the term Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Fetal Alcohol Syndrome, characterized by neurological problems, developmental delay and craniofacial dysmorphism, is its most severe consequence. It has not been determined yet a safe dose of alcohol consumption during pregnancy. Research on attitudes towards drinking alcohol during pregnancy shows that most women are aware that alcohol can affect fetal development, but abstinence is not the most common behavior. To reach a better understanding of the relationships between information, attitudes and consumption, we conducted an exploratory study in Santa Fe city. During the puerperium period women (n=640)

were interviewed and open and closed questions were made inquiring about information and attitudes about alcohol drinking during pregnancy. Most of them (70,4%) referred to have some level of knowledge about adverse consequences of drinking during the pregnancy. Diversity and lack of precision of the recommendations about drinking during pregnancy are important factors that could relate to decisions about their consumption.

## Key Words

Alcohol, Pregnancy, Attitudes, Information

## Bibliografía

- Kesmodel, U. & Schioler Kesmodel, P. (2002). Drinking during pregnancy: Attitudes and knowledge among pregnant Danish women, 1998. *Alcoholism: Clinical & Experimental Research*, 26 (10), 1553-1560.
- Lelong, N., Kaminski, M., Chwalow, J., Bean, K. & Subtil, D. (1995) Attitudes and behavior of pregnant women and health professionals towards alcohol and tobacco consumption. *Patient Education and Counseling*, 25(1), 39-49.
- Peadon, E., Payne, J., Henley, N., D'Antoine, H., Bartu, A., O'Leary, C., Bower, C. & Elliott, E. J. (2010). Women's knowledge and attitudes regarding alcohol consumption in pregnancy: a national survey. *BMC Public Health*, 10:510.
- Raymond, N., Beer, C., Glazebrook, C. & Sayal, K. (2009). Pregnant women's attitudes towards alcohol consumption. *BMC Public Health*, 9, 175-192.

# FATALISMO COMO OBSTÁCULO DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

Orellana, Ligia

Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico

## Resumen

El aumento de la prevalencia de la diabetes mellitus tipo II (DM2) en América Latina, así como los bajos niveles de adherencia al tratamiento de esta enfermedad, constituyen un reto importante para la salud pública en todo el continente. El propósito de este estudio es investigar cómo el fatalismo, una orientación valórica cultural, varía según grupos sociodemográficos e influye en comportamientos de adherencia al tratamiento de la DM2, en las áreas de alimentación, ingesta de medicamentos y ejercicio. Participaron 400 pacientes adultos chilenos, mapuche y no-mapuche, de la Región de la Araucanía, quienes respondieron un cuestionario autorreportado sobre sus niveles de adherencia y la Escala de Fatalismo de Betancourt, además de realizarse un examen de hemoglobina como medida bioquímica indirecta de la adherencia. Los resultados son analizados desde el Modelo Integrador sobre Cultura y Comportamiento de Betancourt, adaptado al cuidado de la salud, para probar empíricamente algunos aspectos del modelo, a la vez que permiten sugerir intervenciones sensibles a las diferencias sociodemográficas, culturales y psicológicas de pacientes con DM2 en Chile.

## Palabras Clave

Diabetes, Fatalismo, Adherencia

## Abstract

FATALISM AS OBSTACLE TO TREATMENT ADHERENCE OF DIABETES MELLITUS TYPE 2

Both the increasing prevalence of diabetes mellitus type II (DM2) and the low levels of treatment adherence for this disease in Latin America pose an important challenge to public health entities across the continent. The aim of this study is to investigate how fatalism, defined as a culturally shared value orientation, varies among socio-demographic groups and influences specific compliance behaviors regarding diet, medicine intake and exercise. 400 adult Chilean patients, of Mapuche and non-Mapuche origin, from the Region of La Araucanía, were administered a self-reported questionnaire about compliance as well as the Betancourt Fatalism Scale, and also had their hemoglobin levels checked as a biochemical indirect measure of compliance. Results are analyzed based on Betancourt's Culture and Behavior Integrative Model, adapted to health behavior, in order to empirically test some aspects of this model and to foster culturally and psychologically sensitive interventions for varying populations of DM2 patients in Chile.

## Key Words

Diabetes, Fatalism, Treatment adherence

## Bibliografía

- Abraído-Lanza, A., Viladrich, A., Flórez, K., Céspedes, A., Aguirre, A.; De La Cruz, A. (2007). Commentary: Fatalismo reconsidered: A cautionary note for health-related research and practice with latino populations. *Ethnicity & Disease*, 17, 153-158.
- Álvarez-Morales, J., Sandoval-Domínguez, F., Dávila-Sánchez, A., Torres-Reyes, A., González-Rangel, M. (2008). Frecuencia de valores de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos del hospital Lázaro Cárdenas del ISSSTE de la ciudad de Chihuahua. *Synthesis*, 46, 1-2.
- American Diabetes Association (2011). Standards of Medical Care in Diabetes. *Diabetes Care*. 34(1), 11-61.
- Asociación Latinoamericana de Diabetes (2002). Guías ALAD de diagnóstico, control y tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2. Colombia: ALAD.
- Baechler, R., Mujica, V., Aqueveque, X., Ramos, L., Soto, A. (2002). Prevalencia de diabetes mellitus en la VII región de Chile. *Revista Médica de Chile*, 130(11), 1257-1264.
- Bennet, P., Moore, L., Smith, A., Murphy, S., Smith, C. (1994). Health locus of control and value for health as predictors of dietary behaviour. *Psychology & Health*, 10(1), 41 – 54.
- Betancourt, H., Flynn, P. (2009). The psychology of health. Physical health and the role of culture and behavior. En Villarruel, F., et al. (Eds.) *Handbook of U.S. Latino Psychology* (pp. 347-361). California: Sage Publications.
- Betancourt, H., Flynn, P., Ormseth, S. (2011) Healthcare Mistreatment and Continuity of Cancer Screening Among Latino and Anglo American Women in Southern California. *Women & Health*, 51(1), 1- 24.
- Betancourt, H., Flynn, P., Riggs, M., Garberoglio, C. (2010). A cultural research approach to instrument development: the case of breast and cervical cancer screening among Latino and Anglo women. *Health Education Research*, 25(6), 991-1007.
- Blanco, A., Díaz, D. (2007). El rostro bifronte del fatalismo: fatalismo colectivista y fatalismo individualista. *Psicothema*, 19(4), 552-558.
- Brownell, K. (1991). Personal responsibility and control over our bodies: when expectation exceeds reality. *Health psychology*, 10(5), 303-310.
- Cosentino, A., Castro, A. (2008). Adaptación y validación argentina de la Marlowe-Crowne Social Desirability Scale. *Interdisciplinaria*, 25(2), 197-216.
- Courtenay, W. (2000). Constructions of masculinity and their influence on men's well-being: a theory of gender and health. *Social Science & Medicine*. 50, 1385-1401.
- Everett, M., (2011). They say it runs in the family: Diabetes and inheritance in Oaxaca, Mexico. *Social Science & Medicine*, 72(11), 1776-1783.
- Ferrando, P., Chico, E. (2000). Adaptación y análisis psicométrico de la escala de discapacidad social de Marlowe y Crowne. *Psicothema*, 12(3), 383-389.
- Flores, C., Juárez, D., Pérez, M. (2003). Orientación religiosa y fatalismo. Tesis