

X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología  
XXV Jornadas de Investigación XIV Encuentro de Investigadores en Psicología  
del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos  
Aires, 2018.

# **Co-ocurrencia de estigmatización por identidad de género y problemas de salud mental en mujeres transgénero enroladas en un estudio clínico.**

Aristegui, Ines y Radusky, Pablo David.

Cita:

Aristegui, Ines y Radusky, Pablo David (2018). *Co-ocurrencia de estigmatización por identidad de género y problemas de salud mental en mujeres transgénero enroladas en un estudio clínico. X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXV Jornadas de Investigación XIV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-122/680>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ewym/wo8>

# CO-OCURRENCIA DE ESTIGMATIZACIÓN POR IDENTIDAD DE GÉNERO Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN MUJERES TRANSGÉNERO ENROLADAS EN UN ESTUDIO CLÍNICO

Aristegui, Ines; Radusky, Pablo David

Fundación Huésped. Argentina - Laboratorio ViiV. Middlesex, Reino Unido

## RESUMEN

Las mujeres transgénero (MT) presentan alta prevalencia de VIH (34%) y baja expectativa de vida (estimada: 35 años). Varios factores actúan de forma sindémica determinando esta vulnerabilidad: estigma y discriminación, dificultades económicas, problemas de salud física y psicológica, entre otros. Se describen las características psicosociales de 50 MT (Me edad=29, RIC:26-33), enroladas en un estudio longitudinal que evalúa determinantes de la retención en el tratamiento de VIH. Se evaluó depresión (CES-D), ansiedad (STAI), personalidad (PID-5), calidad de vida (Índice de bienestar) y estigma por identidad de género (EIG). El 74% realiza trabajo sexual y 62% utilizó de drogas durante el último año. El 62% tiene escuela secundaria incompleta o menor y 44% vive en alojamientos comunitarios. EIG está positivamente relacionado con ideación suicida ( $r=.52$ ), depresión ( $r=.51$ ) y ansiedad ( $r=.50$ ) y negativamente asociado con calidad de vida ( $r=-.37$ ). El EIG se relaciona rasgos de personalidad psicopatológicos como afectividad negativa ( $r=.48$ ) y psicoticismo ( $r=.39$ ). La mayoría (70%) presenta niveles clínicos de afectividad negativa. La mayoría inicia tratamiento de VIH con infección avanzada, pobres condiciones de vida y co-ocurrencia de estigmatización y dificultades psicológicas, particularmente del estado del ánimo. Se necesitan enfoques multidisciplinarios para trabajar con MT en salud.

## Palabras clave

Mujeres transgénero - Identidad de género - Estigma - Salud Mental

## ABSTRACT

CO-OCCURRENCE OF GENDER STIGMATIZATION AND POOR PSYCHOLOGICAL OUTCOMES IN TRANSGENDER WOMEN ENROLLED IN A CLINICAL TRIAL

Transgender women (TGW) is one of the most vulnerable communities. Estimated life expectancy is 35 years old and HIV prevalence is 34%. Co-occurring health problems, stigma and discrimination, and economic hardship are syndemic factors that cumulatively determine their vulnerability. This presentation depicts baseline psycho-social characteristics of 50 TGW enrolled in a longitudinal study that evaluates determinants of retention in HIV-treatment. The assessments included depression (CES-D), anxiety (STAI), personality (PID-5), quality of life (Wellbeing Index) and Gender Identity Stigmatization (GIS). Data were analyzed with SPSS 24. Median age was 29 (IQR: 26-33), 74% reported current sex work and 62% drug use

during the last year. 62% had incomplete secondary education and 44% lives in community housing-rooms. GIS was positively related to suicidal ideation ( $r=.52$ ), depression ( $r=.51$ ), and anxiety ( $r=.50$ ) and negatively associated with quality of life ( $r=-.37$ ). GIS was also associated with maladaptive personality traits: negative affectivity ( $r=.48$ ) and psychotism ( $r=.39$ ). Most TGW (70%) experienced clinical levels of negative affectivity. Most TGW initiate HIV-treatment with advanced infection, poor living conditions and co-occurrences of gender stigmatization and negative psychological outcomes. Since these factors impact on healthcare, a multidisciplinary approach and a multi-component intervention are needed as standard of care when working with TGW.

## Keywords

Transgender women - Gender identity - Stigma - Mental Health

## BIBLIOGRAFÍA

- Arístegui, I. & Zalazar, V. (2014). *Ley de Identidad de Género y acceso al cuidado de la salud de las personas trans en Argentina*. Buenos Aires: Fundación Huesped. doi: 10.13140/RG.2.1.2278.7281 Disponible en: <http://www.huesped.org.ar/wp-content/uploads/2014/05/OSI-informe-FINAL.pdf>
- Claes, L., Bouman, W.P., Witcomb, G., Thurston, M., Fernandez-Aranda, F., & Arcelus, J. (2015). Non-suicidal self-injury in trans people: associations with psychological symptoms, victimization, interpersonal functioning, and perceived social support. *Journal of Sex Medicine*, 12, 168-179. doi: 10.1111/jsm.12711
- Marshall, B.D.L., Socías, M.E., Kerr, T., Zalazar, V., Sued, O., & Arístegui, I. (2015) Prevalence of correlates of suicidal behavior among transgender women in Argentina. *Journal of Homosexuality*. Online. doi:10.1080/00918369.2015.1117898.
- Reisner, S.L., Poteat, T., Keatley, J., Cabral, M., Mothopeng, T., Dunham, E., & Baral, S.D. (2016). Global health burden and needs of transgender populations: A review. *The Lancet*, 388(10042), 412-436.