Patología producida por adhesivos para prótesis parciales.

David Fernández, Susana, Serrano Granger, Carlos, Muro Aceña, Arturo, Labajo González, Elena, Leco Berrocal, Isabel y Aranguren Cangas, José.

Cita:

David Fernández, Susana, Serrano Granger, Carlos, Muro Aceña, Arturo, Labajo González, Elena, Leco Berrocal, Isabel y Aranguren Cangas, José (2005). *Patología producida por adhesivos para prótesis parciales. VIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Oral. Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO), Murcia.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/elenalabajogonzalez/78>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pcQr/ugm>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Introducción: Utilizados desde finales del s. XVIII, hasta 1913, no se patenta el primer adhesivo (EEUU). Se estima que los emplean un 15-33% de los pacientes portadores de prótesis removibles. Las propiedades ideales de un adhesivo son: biocompatibilidad, retención, confort, estabilidad y que no altere la flora oral, ni las funciones y características de la prótesis.

Composición: Los constituyentes de los adhesivos se engloban tres grandes grupos:

A. Los que confieren adhesión: acacia, goma karaya, tragacanto, polímeros sintéticos, polímeros de origen natural, pectina, gelatina.

B. Humectantes, plastificadores y agentes de sabor: lauril sulfato sódico, óxido de magnesio, menta.

C. Antimicrobianos y conservantes: borato sódico, tetraborato sódico, hexaclorofeno, propil-hidroxibenzoato.

Se diferencian dos grandes grupos de adhesivos:

1. Solubles (según el agente transportador): pastas, cremas y polvos.

2. No solubles (según grosor y entramado): almohadillas, láminas.

Indicaciones:

- Pruebas protodóncas.
- Prótesis inmediatas.
- Remodelaciones protéticas.
- Refuerzo psicológico.
- Estructuras comprometidas anatómicamente.
- Consideraciones económicas.
- Alteraciones psicológicas, motrices o ambas.
- Cirugía implantológica, retención prótesis provisional.

Contraindicaciones:

- Como rebase.
- Fracturas de la prótesis.
- Relleno de prótesis mal confeccionadas.
- Hiperplasia tisular.
- Falta de control por el profesional.

Patología oral

- Enmascaramiento tumores benignos y malignos.
- Aumento de dimensión vertical (adhesivos no solubles).
- Algunas con contaminación bacteriana
- Cambios en el pH oral.

Patología sistémica

- Edema angioneurótico (goma Karaya).
- Náuseas, vómitos, dolor epigástrico (goma Karaya).
- Disfagia.
- Urticaria.
- Alergia a algún componente.
- Dificultad de control de hipertensión (Na⁺).

Alteración de la flora oral

Estomatitis protésica

Caries cervical

Determinación del pH de las distintas pastas adhesivas

Tabla*. pH de las Pastas adhesivas. pH METER GLP-21. CRISOM (Alella, Barcelona).

MARCA	CASA COMERCIAL	LOTE	pH
Benfix	VITAFARMA	V-06	4'7±0'1
Bony Plus	BONYFAG	EK-63	4'8±0'1
Corega Súper	STATFORD-MILLER	X04342	3±0'1
Corega Ultra	STATFORD-MILLER	X03131	4'2±0'1
Fitty Dent	FITTYDENT INTERNACIONAL	030308	7'0±0'1
Fixodental extrafuerte	LABORATORIOS ERN	0304-0056	4'9±0'1
Haft-system	PMS HANDELSKONTOR	335001	4'3±0'1
Novafix Extrafuerte	VITAFARMA	V92	3'8±0'1
Novafix Ultrafuerte	VITAFARMA	V43	4'6±0'1
Steradent Ultra 3plus	RECKITT BENCKISER	S41561C033	4'0±0'1

ANÁLISIS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE BIOMEDICINA Y BIOPATOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UEM.

Conclusiones:

- El uso de los adhesivos debe estar limitado a sus indicaciones.
- La aplicación debe estar controlada por el profesional.
- Hay que tener presente que su uso no es inocuo.