

IV Foro Latinoamericano y del Caribe en VIH/SIDA e ITS. Grupo de Cooperación Técnico Horizontal de América Latina y del Caribe en VIH/Sida (GCTH), Buenos Aires, 2007.

Perfiles y tendencias en comportamientos de riesgo asociados a la transmisión de VIH entre usuarios de drogas (Argentina y Brasil, 1998-2004).

Vila, Marcelo, Caiaffa, Waleska Teixeira, Rossi, Diana, Ralón, Gonzalo, Touzé, Graciela y Weissenbacher, Mercedes.

Cita: Vila, Marcelo, Caiaffa, Waleska Teixeira, Rossi, Diana, Ralón, Gonzalo, Touzé, Graciela y Weissenbacher, Mercedes (Diciembre, 2007).
Perfiles y tendencias en comportamientos de riesgo asociados a la transmisión de VIH entre usuarios de drogas (Argentina y Brasil, 1998-2004). *IV Foro Latinoamericano y del Caribe en VIH/SIDA e ITS*. Grupo de Cooperación Técnico Horizontal de América Latina y del Caribe en VIH/Sida (GCTH), Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/gonzalo.ralon/19>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.

Para ver una copia de esta licencia, visite

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <http://www.aacademica.org>.

PERFILES Y TENDENCIAS EN COMPORTAMIENTOS DE RIESGO ASOCIADOS A LA TRANSMISIÓN DE VIH ENTRE USUARIOS DE DROGAS (ARGENTINA Y BRASIL 1998-2004)

Vila, M.¹; Caiaffa, W.T.²; Rossi, D.¹; Ralón, G.¹; Touzé, G.¹; Weissenbacher, M.³

1. Intercambios Asociación Civil. Buenos Aires, Argentina.
2. Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Medicina. Belo Horizonte, MG, Brasil.
3. Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires – CONICET.

Introducción

A la reconocida vulnerabilidad al VIH de los usuarios de drogas inyectables (UDIs), se agrega la transmisión entre usuarios no inyectables (UDNIs) con tasas de prevalencias superiores a las de la población general. Los factores de riesgo asociados a la transmisión en esta población están condicionados por dimensiones biológicas, sociales, culturales, políticas y legales. Las tasas de infección entre usuarios muestran variaciones considerables dentro de y entre países posiblemente reflejando diferencias en las situaciones de riesgo.

Objetivos

Reestructurar, estandarizar y combinar de modo sistemático datos obtenidos en diez investigaciones realizadas en Argentina y Brasil entre 1998 y 2004. Presentar un primer análisis descriptivo de los datos agregados. Se estudian perfiles y tendencias en comportamientos de riesgo asociados a la transmisión de VIH entre UDIs.

Metodología

Se trabajó con estudios transversales basados en cuestionarios estructurados. Todos incluyeron prevalencia de VIH, autoreferida o por serología. Se conformó una base de datos única con 2378 registros agregados, reestructurada de acuerdo con criterios unificados, considerando variables sociodemográficas, prácticas de uso de drogas y sexuales e infección por VIH. Se utilizó el programa SPSSv11.5.




Resultados

El 79% eran hombres, con una mediana edad de 28 años. Una media edad de inicio de consumo inyectable de 18 años. El 9,6% refiere intercambio de sexo por drogas. Respecto al uso de sustancias, la más consumida es la cocaína: 81% inhalada, 72,5% inyectada y 7,3% fumada. La prevalencia VIH total es 32,3%, 6,6% en UDNIs y 42,1 % en UDIs.

En las tablas se presenta un primer análisis descriptivo de las variables referidas a factores sociodemográficos, de consumo de drogas, problemas legales y prevalencia de infecciones en estos estudios en los dos países.

Variables	Categorías	Argentina	Brasil	Total
		(N = 1.234)	(N = 1.144)	(N = 2.378)
Sexo	Femenino	24,3%	17,2%	20,9%
	Masculino	75,7%	82,8%	79,1%
	n válido	1.234	1.141	2.375
Edad	Media	30	29	29
	Mediana	29	27	28
	Mínimo	16	14	14
	Máximo	65	68	68
	n válido	1.234	1.142	2.376
Escolaridad formal	Hasta 7 años	43,5%	78,5%	60,0%
	Más de 7 años	56,5%	21,5%	40,0%
	n válido	1.232	1.097	2.329
Trabaja	Sí	45,9%	41,3%	43,7%
	No	54,1%	58,7%	56,3%
	n válido	1.233	1.110	2.343

Variables	Categorías	Argentina	Brasil	Total	
		(N = 1.234)	(N = 1.144)	(N = 2.378)	
Uso inyectable de drogas	UDI	47,1%	100,0%	72,5%	
	UDNI	52,9%	0,0%	27,5%	
	n válido	1.234	1.144	2.378	
Cocaína inhalada	Sí	89,8%	74,3%	81,8%	
	No	10,2%	25,7%	18,2%	
	n válido	1.085	1.143	2.228	
Cocaína fumada	Sí	26,8%	48,6%	38,1%	
	No	73,2%	51,4%	61,9%	
	n válido	1.056	1.143	2.199	
Problemas legales	Preso alguna vez	Sí	53,3%	34,5%	43,8%
		No	46,7%	65,5%	56,2%
	n válido	1.068	1.083	2.151	
Preso por tenencia de drogas	Sí	40,0%	7,4%	27,7%	
	No	60,0%	92,6%	72,3%	
	n válido	603	365	968	



Discusión

Este primer análisis descriptivo nos confirma la alta prevalencia de VIH entre UDIs, incluso en UDNIs. Observamos poblaciones con características similares en los dos países, aunque con algunas diferencias en el nivel de instrucción formal y en los problemas legales asociados al uso. El próximo objetivo de este estudio será profundizar en el análisis de los factores de riesgo, incluyendo otros países de la América Latina. Es necesario seguir desarrollando programas de reducción de daños para disminuir el impacto de la epidemia en estas subpoblaciones.