

# Seroincidencia y seroprevalencia de VIH en usuarios de drogas en Argentina.

Ralón, Gonzalo, Pando, María de los Ángeles, Fassano, Alfredo, Naveira, Jorge, Parga, Jimena, De Lisa, Rubén, Barros, Sandra, Verón, Dolores, Rossi, Diana, Salomón, Horacio y Vila, Marcelo.

Cita: Ralón, Gonzalo, Pando, María de los Ángeles, Fassano, Alfredo, Naveira, Jorge, Parga, Jimena, De Lisa, Rubén, Barros, Sandra, Verón, Dolores, Rossi, Diana, Salomón, Horacio y Vila, Marcelo (Diciembre, 2009). Seroincidencia y seroprevalencia de VIH en usuarios de drogas en Argentina. *II Congreso Nacional de SIDA*. Sociedad Argentina Interdisciplinaria de Sida, Salta, Argentina.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/gonzalo.ralon/7>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.

Para ver una copia de esta licencia, visite

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <http://www.aacademica.org>.

Código de Trabajo 25380 - DNI Profesional Responsable 29799565

*Título y Autores*

SEROINCIDENCIA Y SEROPREVALENCIA DE VIH EN USUARIOS DE DROGAS EN ARGENTINA

RALON, G(1); PANDO, M(2); FASSANO, A(3); NAVEIRA, J(4); PARGA, J(5); DE LISA, R(6); BARROS, S(7); VERON, D(8); ROSSI, D(1); SALOMON, H(2); VILA, M(1)

*Datos Secundarios*

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| UNIDAD TEMATICA              | Epidemiología                       |
| Profesion                    | Sociólogo/investigador              |
| Area de trabajo              | Investigación - VIH y uso de drogas |
| ¿Quiere asociarse a SAISIDA? | No                                  |

*Texto Libre*

1 Intercambios Asociación Civil. Fogarty International Training and Research project D43TW001037-06  
2 CNRS - UBA.  
3 Programa Municipal de Sida. San Martín.  
4 CENARESO.  
5 Fundación CITIDAD. La Plata.  
6 Programa Andrés. Rosario.  
7 Asociación Ariadna. Tucumán.  
8 Perspectiva Social. Córdoba.

Antecedentes

Argentina tuvo históricamente una alta proporción de casos de sida en usuarios de drogas inyectables (UDI) pero conocemos poco sobre la prevalencia de VIH en usuarios de drogas (UD) actuales. El objetivo del estudio fue conocer la seroprevalencia e incidencia de VIH en UD y su relación con el riesgo derivado de las prácticas sexuales y de uso de drogas. Se desarrolló entre 2006 y 2008, en Buenos Aires (CABA), La Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán y Gran Buenos Aires (GBA).

Métodos

Se reclutaron 738 UD que habían consumido cocaína, anfetaminas u opiáceos por cualquier vía al menos una vez por semana en los 6 meses previos a la entrevista y que no tenían diagnóstico positivo de VIH. Se realizó consentimiento informado, análisis serológicos para VIH y consejería. Se utilizó un cuestionario estructurado. El 44,2% fueron contactados en su entorno barrial por bola de nieve y el resto en centros de tratamiento por drogas estatales y no estatales.

Resultados

Sexo: 67,7% hombres; 32,3% mujeres. Mediana edad: 27 años.  
Residencia: CABA y GBA: 78,7%; otras ciudades: 21,3%.  
77,9% tenía el nivel de instrucción primaria aprobado o un nivel inferior.  
8,5% usó drogas por vía inyectable alguna vez en la vida, y 3,9% lo hizo durante el último año.  
20% de los hombres refiere sexo anal con hombres el último año.  
Seroprevalencia VIH: 4,2% (IC95% 2,7-5,7), sin diferencia por sexo.  
La incidencia de VIH fue de 2,7 por cien personas/año (IC95% 0,9-4,4), sin diferencia por sexo.  
Variables asociadas con mayor nivel de infección: OR > 1 (IC95%)  
Contactados en entorno barrial: 4,6 (1,9-10,7)  
UDI: 2,5 (1,1-7,0)  
UDI último año: 4,0 (1,3-12,4)  
Sexo anal entre hombres último año 6,4 (2,7-14,8)  
La comparación de medias de edad resultó estadísticamente significativa (ANOVA, p<0,001): positivos: 35,4 años; negativos: 28 años.

### *Conclusiones*

Se observa en este grupo una prevalencia de VIH mayor que en la población general (0,6%). El lugar de reclutamiento, el uso inyectable y las prácticas de sexo entre hombres y la edad son variables asociadas a la infección.

Es necesario conocer mejor las prácticas de riesgo sexual y de uso de drogas, para viabilizar estrategias preventivas adecuadas y ampliar la accesibilidad de los usuarios de drogas a los servicios.